



X-Clinic

Памятка по фиброгастродуоденоскопии

Вечером накануне исследования, при отсутствии проблем с эвакуацией содержимого из желудка, разрешается легкий ужин (до 20:00 часов).

Если исследование проводится до 15:00:

Проводится строго натощак.

В день исследования запрещается прием пищи и жидкости.

По возможности, желательно воздержаться от курения.

Если исследование проводится после 15:00:

Утром разрешен легкий завтрак (йогурты и творожки без добавок, курица, индейка, яйца (отварные, омлет), манная каша, отварная рыба, чай зеленый, чёрный, травяной, соки, молочные и кисломолочные продукты), до времени проведения исследования - не есть 8 часов и не пить 4 часа.

Прием большинства медикаментов разрешен, однако, должен быть осуществлен не позднее, чем за час до исследования.

Пациентам с хроническими заболеваниями ССС, органов дыхания, сахарным диабетом и др. НЕЛЬЗЯ ОТМЕНЯТЬ приём своих обычных препаратов. В день осмотра нужно принять необходимые препараты, но запить их только глотком воды (не больше глотка). Запрещается принимать лекарства, которые плохо эвакуируются из желудка и мешают исследованию (активированный уголь, препараты железа, антацидные препараты, адсорбенты)

Если исследование проводится с медикаментозной седацией (анестезией) пить и есть перед ним категорически запрещено!

За 8 часов до исследования нужно перестать принимать пищу, за 4 часа - перестать пить воду и другие напитки.

Если эти условия не выполнены, эндоскопическое исследование отменяется!

1 / 3



X-Clinic

- Противопоказания к проведению анестезии:
- Наличие декомпенсированных болезней сердечно-сосудистой системы, свежий (до 6 мес.) инсульт или инфаркт;
- Наличие декомпенсированной патологии дыхательной системы (дыхательная недостаточность 3 ст);
- Аллергия на пропофол.
- Противопоказания к проведению ВФГДС:
- Гипертоническая болезнь (III ст - прямое противопоказание к проведению ФГДС в амбулаторных условиях);
- Сужение пищевода из-за новообразований и в силу физиологических причин;
- Сужение отделов желудка;
- Признаки непроходимости кишечника;
- Сильное желудочное кровотечение;
- Психические заболевания в стадии обострения;
- Выпячивание стенок пищевода;
- Аневризма аорты;
- Инфаркт миокарда;
- Инсульт;
- Нарушения в работе сердца (не купированные);
- Сразу после гипертонического криза;
- Бронхиальная астма в обострении;
- Сильный рвотный рефлекс;
- Увеличенная щитовидная железа;
- Заболевания верхних дыхательных путей в тяжелой форме;
- Нарушение свертываемости крови;
- Простудные заболевания, когда проведение процедуры невозможно (заложенность носа, кашель, отек гортани, высокая температура);
- Беременность во II и III триместрах.

2 / 3



- При наличии у Вас перечисленных заболеваний или состояний, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** сообщите о них врачу-эндоскописту до начала проведения исследования.
- При процедуре с медикаментозной седацией (анестезией) в течение 2 часов после процедуры категорически запрещается управлять личным автомобилем.
- **До 39 лет** Обследование перед проведением анестезии не требуется.
- **40 - 59 лет** Наличие электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой давностью не более 14 дней.
- **После 60 лет**
- Наличие результатов анализа крови на гемоглобин и гематокрит (эритроциты и тромбоциты) давностью не более 1 месяца.
- Анализ крови на глюкозу и креатинин (давностью не более 1 месяц).
- Рентгенография легких (давностью не более 1 года).
- Наличие электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой давностью не более 14 дней
- Заключение по результатам консультации врача терапевта.
- **Без предъявленных исследований врач анестезиолог-реаниматолог медикаментозную седацию не проводит!**
- **Окончательное решение о возможности проведения ВФГДС/ВКС ВФГДС/ВКС с анестезией принимает врач анестезиолог-реаниматолог по результатам консультации непосредственно перед проведением исследования.**
- При себе иметь медицинские справки, выписки и данные предыдущих исследований, при их наличии